

**Пациенты и туберкулез: Улучшение результатов
лечения подходом ориентированным на пациента и
доступ к новым методам лечения**

**Пятый симпозиум по вопросам лечения туберкулеза в Восточной
Европе и Центральной Азии
Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии
и «Врачи без границ» / Médecins Sans Frontières**

22-23 марта 2016 , ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

**Лечение пациентки Т
бедаквилином**



MINISTRY OF LABOUR,
HEALTH AND SOCIAL
AFFAIRS OF GEORGIA

Лечение пациентки ТД бедаквилином

- Информация о пациентке из Таджикистана
- Некоторое сравнение с другими пациентами в когорте (всего 5 пациентов):
 - Средний возраст 31 год (разброс 15-42 лет)
 - Все ранее проходили как минимум 3-месячное лечение МЛУ-ТБ
 - Длительность заболевания – от 3 месяцев до 3 лет
 - Трое женщин, двое мужчин

Пациентка, Т1

Женского пола, возраст 15,5 лет

- Явилась на прием в марте 2015 г.:
 - Кашель и температура в течение 10 дней
 - Безрезультатно лечилась антибиотиками.
- Контакты: 17-летняя двоюродная сестра
 - Жила в одной комнате с пациенткой
 - Проходила лечение от легочного туберкулеза, устойчивого ко всем препаратам, на которые проводился тест.
 - На пятом месяце терапии
 - Анализ результата мазка и культуры – оставался положительным.
- Начато лечение по схеме Cm, Z, Mfx, Lzd, Cfz, Pto, Cs, Amx/Clav + B6
 - В течение первых 3 месяцев лечения результаты мазка, а затем культуры оставались положительными.
 - ⇒ **Была выбрана консультантом по ТБ в качестве подходящего кандидата для лечения бедаквилином**
- Июнь 2015 г.: начато лечение по схеме **Z-Cm-Pto-Cs-Lzd-Cfz-Lfx-Bdq + B6**

Пациентка ХХ

- Побочные явления
 - Слабость, утомляемость
 - Слабая тошнота 1 или 2 раза в неделю, которая не мешала пациентке есть или пить (омепразола или ондастерона не потребовалось)
 - Отсутствие аппетита в течение первых 3 месяцев лечения
 - Пониженный уровень магния, но в пределах нормы (дополнительного магния не назначалось). Кальций и натрий - стабильны
 - Один случай, когда, по словам окружающих, она «сидела в кресле» и «упала»
 - Нормальное кровяное давление в положении лежа и стоя, пульс ровный, электролиты без изменений.
 - ⇒ Пристальное наблюдение
 - ⇒ В будущем рецидивов не было
- Выписана домой после 3 месяцев лечения бедаквилином по социальным обстоятельствам семьи.

Пациентка, ТЈ

- После выписки
 - Небольшие жалобы: слабая боль в груди слева в течение недели и непрерывная тошнота в течение 1 недели
 - ⇒ Симптомы прошли сами, без дальнейшего обследования или лечения
- Январь 2016 г.
 - Жаловалась на шум и/или боль в ушах
 - За исключением ТЈ, у всех остальных 4 пациентом имелись клинические и аудиографические свидетельства ухудшения слуха, что привело к изменению схемы и/или отмене инъекций аминогликозида.
- Февраль 2016 г.
 - По-видимому порезала себя ножом
 - Возник вопрос о наличии депрессии
 - ⇒ Были временно отменены Cs и Pto до прохождения консультации у психиатра
 - ⇒ Не было выявлено изменений психического состояния и лечение было продолжено
- QTc: проблем не было
 - Достиг максимум 387 (мин. 355, средн. 370)
 - Меньше колебаний, чем у других участников в когорте (единственная в когорте, у кого QTc не поднялось выше 400 или не увеличился более чем на 50 между 2 последовательными замерами)
- 60 дней лечения бедаквилином
 - Негативизация мазка и культуры